

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Rue Saint-Jean ● BP 19 ● 31130 BALMA Tél. (61) 24.06.51 PUBLICATION PÉRIODIQUE Abonnement annuel: 92 F Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne CCP: 8612-11 R Toulouse

1.5.S.N.: 0752-2053

BULLETIN Nº 12 DU 14 AOUT 1984

MAIS

SESAMIE ET PYRALE

★ Situation

Le second vol de papillons de Sésamie a commencé début août et s'est intensifié à partir du 10 août.

Le second vol de papillons de Pyrale débute.

★ Prévision

Le maximum du deuxième vol de Sésamie devrait se situer aux environs du 20 août.

Le deuxième vol de Pyrale devrait s'intensifier rapidement.

Remarque

Le second vol de **Sésamie** est assez tardif en 1984 et devrait coïncider partiellement avec le second vol de la **Pyrale**.

★ Préconisations

La protection insecticide doit viser à protéger essentiellement les épis.

Deux types de situations à envisager :

1) Présence simultanée de Sésamie et de Pyrale

Une intervention devra être envisagée dans le courant de la semaine du 20 au 25 août.

2) Présence de Pyrale seulement

L'intervention pourra être retardée jusqu'aux derniers jours du mois d'août.

Produits à utiliser

Spécialités liquides à base de :

- deltaméthrine	à	20	g/ha	-	DECIS	à	0,8 I/ha
- tenvaiérate	à	150	g/ha	-	SUMICIDIN 10	à	1.5 l/ha
- cypermethrine	ā	75	g/ha	~	CYMBUSH (AFIL SUPER) RIPCORD 5	à	0,75 I/ha

P15